

# Bronchiolib

GÉRER LA BRONCHIOLITE À DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aiguë et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

## Comment moucher mon bébé ?

### Quand ?

- Avant chaque repas
- Avant de coucher votre enfant
- Si le nez de votre enfant est bouché



### Quel produit utilisé ?

- Une boîte de mouchoir
- Sérum physiologique en dosette de 5 ml



### Comment réaliser le soin ?

1. Se laver les mains ;
2. Installer le bébé sur le dos, sur un plan dur et sécurisé ;
3. Tourner la tête sur un côté et bien la maintenir ;
4. Introduire doucement la dosette de sérum physiologique à l'entrée de la narine supérieure de votre bébé ;
5. Presser franchement et rapidement au minimum la moitié de la pipette de sérum physiologique dans le nez de votre enfant ;
6. Essuyer le nez avec un mouchoir pour recueillir les sécrétions ;
7. Renouveler le geste dans la deuxième narine ;
8. Se laver les mains.



Bronchiolib est financé par l'ARS des pays de la Loire, l'URPS médecins libéraux, l'URML, l'URPS infirmiers libéraux (URPS IL)

Avec la collaboration de la CPAM et du service de pédiatrie du CHU de Nantes